

PALMatrap

Kit de piégeage du charançon rouge du palmier



PALMatrap est spécialement conçu pour piéger le charançon rouge du palmier *Rhynchophorus ferrugineus*. Ce piège est l'outil de surveillance indispensable, complémentaire de la protection biologique des palmiers assurée par PALMANEM.

Ses avantages

- Structure en pyramide et couleur adaptée à la biologie de l'insecte.
- Efficacité prouvée par des organismes indépendants français et étrangers.
- Esthétique et discret, PALMatrap se fond dans le décor.
- PALMatrap ne s'enterre pas et s'utilise sans eau.
- Phéromone d'agrégation de qualité reconnue.
- Piège les individus mâles et femelles.




S'utilise sans eau
Ne s'enterre pas
Facile d'installation
Peu de maintenance

Efficacité de PALMatrap

Par rapport au piège-seau standard

2 fois plus de captures qu'avec un piège-seau standard



Essai CEQA (Centro de Ecología Química de Agrícola), Universidad polytécnica de Valencia & Instituto Agroforestal Mediterraneo - Espagne

Informations importantes

Dans l'arrêté du 21 juillet 2010 (Journal Officiel) relatif à la lutte contre *Rhynchophorus ferrugineus*, il est stipulé que la lutte contre le charançon rouge et sa surveillance sont obligatoires sur tout le territoire français.

Instructions de montage



Code produit : 08007

Le Kit contient :

- Un piège conique noir spécifique du charançon rouge
- Un récipient noir et 4 brides de fixation
- Un diffuseur de phéromone d'agrégation (PHERODIS Rhynchophorus)
- Un mode d'emploi



Code produit : 08025

Simple et rapide, votre piège est prêt à l'emploi en 3 mouvements...

1. Suspendre la phéromone au crochet prévu à cet effet, puis fixer le tout à la pyramide (clips faciles).
2. Placer dans le récipient noir des débris de palmiers et éventuellement une pierre afin d'assurer la stabilité du piège dans les régions ventées.
3. Fixer le récipient noir à la pyramide avec les 4 brides fournies selon le schéma indiqué.



Mode d'emploi

	Niveau faible	Niveau élevé
	Région infestée à plus de 10 km	Palmiers infestés à proximité
Implantation sur grandes surfaces > 1ha (Pépiniéristes, communes...)	2 pièges / ha	4 à 6 pièges / ha
Implantation sur petites et moyennes surfaces < 1ha (Maisons particulières...)	1 à 2 pièges / ha	2 à 6 pièges / ha

- Placer les pièges en périphérie de la zone plantée de palmiers, avec une distance minimale de 50 mètres entre chaque piège.
- Ne pas placer les pièges trop près des palmiers ; respecter une distance minimale de 20 m avec le palmier le plus proche (dans la mesure du possible).

En cas de doute, contactez votre distributeur qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation.

Durée de vie et conservation de l'attractif

La phéromone est à remplacer tous les 90 jours (3 mois environ). Elle doit être conservée dans un réfrigérateur réservé à cet usage avant son utilisation et peut être conservée dans un congélateur sur des durées plus longues.



Porter des gants lors de la manipulation de l'attractif.



Votre distributeur :

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

JARDICA

141, Avenue de Toulon
83260 LA CRAU

Tél. : 04 94 66 73 23 - Fax : 04 94 66 00 79
SAS au capital de 37000 €
RCS Toulon D353 976 921 Code Naf : 515 L
Siret : 353 976 921 00026 - TVA FR 92 353 976 921